

Jelentés a fertőző betegségek általi fenyegetettségről Európában

European Centre for Disease Prevention and Control

Communicable Disease Threats Report. CDTR Week 14, 1-7 April 2018

Kulcsszavak: népegészségügy, fertőző betegségek, influenza elleni védőoltás, ECDC, Európa

Forrás Internet-helye:

<https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-7-apr-2018.pdf>

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC) a Communicable Disease Threats Report legújabb számának megjelenésével összefüggésben felhívja a figyelmet az oltási programok folytatásának és intenzívebb alkalmazásának szükségességére azokban az országokban, ahol a szezonális influenzajárvány még nem érte el tetőpontját.

A jelentés szerint az európai régióban tovább terjednek az influenzavírusok, az egyes országok pedig a légúti fertőzések csekély, vagy mérsékelt aktivitásáról számolnak be. Az influenza vírus két típusa (A és B) Európában párhuzamosan terjed, többségében B típusú vírus, ill. a B/Yamagata-vonal dominál. Figyelemreméltó tény, hogy az elsődleges ellátásban az influenzavírusra végzett tesztek 35%-a pozitív volt, ami az ECDC szerint az influenza szezon ezen szakaszában igen magas arány.

Az ECDC hozzáfűzi, hogy azokban az országokban, ahol az influenzajárvány még nem tetőzött, az időskorúak, a krónikus megbetegedésekben szenvedők és egészségügyi alkalmazottak körében folytatódjanak az oltási programok.

Az ECDC szerint a neuraminidáz-gátlókkal való antivirális kezelés az influenza miatt magas komplikációs kockázatot hordozó, valamint masszív és gyors lefolyású tüneteket mutató betegeknél alkalmazandó. Az antivirális profilaxis az influenzajárványok korai szakaszában inkább zárt környezetben, pl. ápolási otthonokban alkalmazandó.