

*Az alkoholfogyasztás és a globális betegségteher
a világ 195 országában 1990 és 2016 között
a Global Burden of Disease Study 2016 adatai alapján –
Alcohol use and burden for 195 countries and territories,
1990-2016; a systematic analysis for the
Global Burden of Disease Study 2016*
The Lancet, Published: August 23, 2018
DOI: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)31310-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31310-2)

Kulcsszavak: globális egészségügy, népegészségügy, szenvedélybetegségek, alkohol, alkoholfogyasztás, Global Burden of Disease, Bill & Melinda Gates Foundation, nemzetközi

Forrás Internet-helye:

[https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(18\)31310-2/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31310-2/fulltext)

A „*Global Burden of Disease-Study 2016*” szerint az alkoholfogyasztás a 15 és 49 év közötti lakosság körében előforduló halálesetek tíz százalékával hozható összefüggésbe. Évente a nők két, a férfiak hét százaléka hal meg valamilyen alkoholfogyasztással összefüggő megbetegedésben. 2016-ban a 15 és 49 év közöttiek körében az idő előtti halálozás és fogyatékosná válás fő oka volt.

Annak kockázata, hogy valaki megbetegedjék a 23 figyelembe vett betegség valamelyikében, mint a diabétesz vagy a tuberkulózis, az absztinensekhez viszonyítva minden naponta fogyasztott tíz gramm alkohollal (negyed liter sör, vagy nyolcad liter bor), 0,5%-kal növekedik. Abszolút számokban ez azt jelenti, hogy 100.000 fő közül 918 volt érintett, szemben 914-gyel. Az abszolút különbség tehát 100.000 közül évente négy fő, azaz 0,004 százalék.

Finanszírozás: *Bill & Melinda Gates Foundation*