

***Az Egészségügyi Világszervezet ajánlásai
a szükségtelen császármetszések számának csökkentésére***

Egészségügyi Világszervezet

Lancet (2018; doi: 10.1016/S0140-6736(18)31928-7) , Published: October 13 2018

Kulcsszavak: globális egészségügy, reprodukív medicina, szülészet, nőgyógyászat, császármetszés, Egészségügyi Világszervezet, Nemzetközi Nőgyógyászati és Szülész Szövetség, International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO)

Forrás Internet-helye: <http://www.who.int/reproductivehealth/publications/non-clinical-interventions-to-reduce-cs/en/> ;

WHO recommendations non-clinical interventions to reduce unnecessary caesarean sections (82 p.):

<http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275377/9789241550338-eng.pdf?ua=1>

<http://www.who.int/reproductivehealth/guidance-to-reduce-unnecessary-caesarean-sections/en/> ;

A Lancet cikksorozata: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(18\)31928-7/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31928-7/fulltext) ; <https://www.figo.org/>

Az Egészségügyi Világszervezet a Nemzetközi Nőgyógyászati és Szülész Szövetség (International Federation of Gynecology and Obstetrics – FIGO) konferenciáján (Rio de Janeiro, 2018. október 14-19.) ajánlásokat fogalmazott meg a szükségtelen császármetszések számának lehetséges korlátozására vonatkozóan.

Szakértők szerint világviszonylatban évente 6,2 millió orvosilag indokolatlan császármetszésre kerül sor. Ezek felét Kínában és Brazíliában végzik. Latin-Amerikában sok helyütt a császármetszés a bevett eljárás. Ebben a régióban a gyermekek 44,3%-a, a Dominikai Köztársaságban 58,1%-a így jön világra. Brazíliában a magasabb képzettséggel rendelkezők 54,4%-a, az alacsonyabb képzettségűek 19,4%-a dönt a császármetszés mellett. Latin-Amerikában a császármetszések többségét privát klinikákon végzik és az ottani orvosokról azt rebesgetik, hogy el sem sajátítják a vaginális szülés levezetését.

A császármetszések aránya 2000. óta Észak-Amerikában 24,3%-ról 32%-ra, Nyugat-Európában 19,6%-ról 26,9%-ra növekedett. Ám egy idő óta a császármetszés az iszlám kultúrkör országában is státusz-szimbólummá vált az elitek körében.

Kínában a túlellátás csak regionális jellegű: a császármetszés egyes régiókban az összes szülés 62%-át, másokban azok 4%-át teszik ki, ami már felér az alulellátottsággal. Indiában a császármetszések aránya az egyes régiókban 6% és 49% között mozog.

Ezzel szemben Afrika déli régióiban alulellátottság uralkodik. Az arány Dél-Szudánban 0,6%. Az afrikai kontinensen emiatt számos halvaszülésre kerül sor.

A császármetszések aránya világviszonylatban jelenleg 21%. 2015-ben 140,6 millió gyermek közül 29,7 millió született császármetszéssel. 2000-ben 131,9 millió szülésre 16 millió császármetszés jutott, ami 12%-os aránynak felel meg.