

**A CONCORD-projekt eredményei a rákos megbetegedésekben
való túlélés trendjeiről 2000 és 2014 között**

Lancet (2018; doi: 10.1016/ S0140-6736(17)33326-3), Published: 30 January 2018

Kulcsszavak: népegészségügy, rákos megbetegedések, túlélési ráta, CONCORD-3, nemzetközi

Forrás Internet-helye: [http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(17\)33326-3/abstract](http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)33326-3/abstract)

Professor Michel Coleman BA BM BCh MSc FFPH:
<https://www.lshtm.ac.uk/aboutus/people/coleman.michel>

Michel P. Coleman és mt. (London School of Hygiene & Tropical Medicine) tanulmánya szerint 2000. óta az ötéves túlélési ráta a rákos megbetegedések többségénél, még a máj és a tüdő különösen agresszív rosszindulatú daganatai esetén is növekedett. A kutatás 71 ország 322 rákregiszterének eredményeire, 37,5 millió beteg adataira, 18 rákos megbetegedésre terjedt ki.

A *London School of Hygiene & Tropical Medicine* melletti **CONCORD-projekt** jelentésének közzétételére 2008 és 2015 után harmadik alkalommal került sor.

Nemzetközi szinten a túlélési ráta tekintetében a legnagyobb különbségek a gyermekek agydaganatai vonatkozásában jelentkeznek. A túlélési ráta Dániában és Svédországban meghaladja a 80%-ot, Mexikóban és Brazíliában nem éri el a 40%-ot. Az afrikai gyermekeknek semmi esélyük a túlélésre. Nigériában egyetlen végzettséggel rendelkező onkológus sem működik.

Különbségek mutatkoznak a fejlett országok között is. A gyomorrák túlélési rátája Dél-Koreában és Japánban meghaladja a 60%-ot, az ötéves túlélési ráta az országok többségében 30% alatt van. Ennek oka, hogy a két ázsiai országban hatékony a korai felismerés. Európában és Észak-Amerikában, ahol a gyomorrák ritkábban fordul elő, a betegséget csak előrehaladott stádiumban ismerik fel.

Mivel az endoszkópiás gyomorrák szűrés a nyelőcsőre is kiterjed, az ötéves túlélési ráta Japánban 36%, a nyugati országokban viszont a betegek 20-30%-a él öt évig vagy annál tovább a diagnózist követően. Az ötéves túlélési ráta valamelyest javult.

A rákos betegek túlélési rátája világviszonylatban Skandináviában a legmagasabb. A közelmúltban Dánia még kivétel volt, de az utóbbi években felzárkózott. A prosztatatarák ötéves túlélési rátája 64%-ról 86%-ra, a tüdőráké 10%-ról 17%-ra, a nyelőcsőráké 8%-ról 14%-ra, a végbélráké 53%-ról 65%-ra növekedett. A szerzők szerint a növekedés az utóbbi tizenöt év során eszközölt beruházásoknak, a betegutak felgyorsításának, a várakozási listák állami ellenőrzésének tulajdonítható.