

A kórházi palliatív ellátás helyzete Svájcban 2018-ban

Bundesamt für Statistik (BFS)
Medienmitteilung, 8. 6. 2020, 8.30
14 Gesundheit

Kulcsszavak: egészségügy, kórházi ellátás, palliatív ellátás, Svájc

Forrás Internet-helye: <https://www.bfs.admin.ch/news/de/2020-0383> ;
<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.13067700.html>

2018-ban a kórházban elhalálozottak 12%-a utolsó hospitalizációja során komplex palliatív kezelésben vagy speciális palliatív ellátásban részesült. Ez az arány a daganatos megbetegedésben szenvedőknél 29% volt.

2018-ban 5.900 hospitalizált személy részesült komplex palliatív orvosi kezelésben vagy speciális palliatív ellátásban. Tíz beteg közül több mint nyolc (81,8%) esetében daganatos állapotot állapítottak meg fő diagnózisként. Ezzel szemben a szív- és érrendszeri megbetegedésekben szenvedők 4,2%-a részesült palliatív ellátásban. 2018-ban a palliatív ellátásban részesített személyek több mint fele (52,0%) utolsó hospitalizációja során palliatív ellátás mellett halt meg.

A kórházban elhalálozott személyek átlagos életkora elhalálozásuk időpontjában a palliatív ellátásban részesülőknél 71,0 év, palliatív ellátásban nem részesülőknél 75,9 év. A palliatív ellátásban részesülők alacsonyabb átlagéletkora az elhalálozás időpontjában azzal függ össze, hogy daganatos megbetegedésben szenvedtek. A daganatos megbetegedésekben szenvedők pedig jóval korábban halnak meg, mint azok, akik keringési rendszeri vagy légzőszervi megbetegedésekben szenvednek.

A kórházban palliatív ellátásban részesített nők körében elhalálozottak aránya magasabb, mint azoké, akik nem részesültek palliatív ellátásban és kórházban haltak meg (46,4% vs. 44,9%). Ez elsősorban azzal függ össze, hogy sokkal több nő hal bele specifikusan a nők körében gyakori rákos megbetegedésekbe (mell-, petefészek- és méhrák), mint a palliatív ellátásban részesített, specifikusan a férfiak körében gyakori rákos megbetegedésekben szenvedők (pl. prosztatatarák).

A palliatív ellátásban részesített személyek, akik kórházi tartózkodásuk során haltak meg, intenzívebb és huzamosabb ideig tartó kórházi kezelésben részesültek, mint azok, akik nem részesültek palliatív ellátásban. Előbbiek a halálukat megelőző tizenkét hónap során átlagosan 3,6 alkalommal kerültek kórházba és összesen 49 napig tartózkodtak ott. Utóbbiakat 2,7 alkalommal utalták kórházba és összesen 29 napot töltöttek ott.

Tájékoztatás

Jean-François Marquis, BFS, Sektion Gesundheitsversorgung, Tel.: +41 58 463 67 54,
E-Mail: jeanfrancois.marquis@bfs.admin.ch

Medienstelle BFS, Tel.: +41 58 463 60 13, E-Mail: media@bfs.admin.ch