

## **LSD 80**

PZ, 14. 04. 2023 14:00

**Kulcsszavak:** gyógyszer, gyógyszerkutatás, kábítószer, LSD, lizergsav-dietilamid, pszichedelikus hatóanyagok, nemzetközi

**Forrás Internet-helye:** <https://www.pharmazeutische-zeitung.de/vom-arzneimittel-zur-droge-zum-arzneimittel-139568/>

**A 31. European Congress of Psychiatry (EPA) (Paris, 25-28 March 2023) a pszichedelikus hatóanyagok kutatásáról. Apud Univadis from Medscape:**

[https://www.univadis.de/viewarticle/c700fdac-5304-497c-b9dd-196e6ae1c85b?uuid=c700fdac-5304-497c-b9dd-196e6ae1c85b&uac=347207CJ&ecd=mkm\\_ret\\_230430\\_uni-DE\\_TSPE-ExcNews\\_5123162&u=g7Nnk16ewguWS5hWLN23V%2F9E96keG%2B95Js9Lm6D2gtUI4Soq8URsQKrZiarLAUYJ&utm\\_source=adhoc+email&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=adhoc\\_de\\_tspe-excnews\\_20230430\\_ann&utm\\_content=5123162&utm\\_term=&sso=true](https://www.univadis.de/viewarticle/c700fdac-5304-497c-b9dd-196e6ae1c85b?uuid=c700fdac-5304-497c-b9dd-196e6ae1c85b&uac=347207CJ&ecd=mkm_ret_230430_uni-DE_TSPE-ExcNews_5123162&u=g7Nnk16ewguWS5hWLN23V%2F9E96keG%2B95Js9Lm6D2gtUI4Soq8URsQKrZiarLAUYJ&utm_source=adhoc+email&utm_medium=email&utm_campaign=adhoc_de_tspe-excnews_20230430_ann&utm_content=5123162&utm_term=&sso=true)

**Michael Bogenschutz, MD:**

<https://centerforpsychedelicmedicine.org/michael-bogenschutz/>

Az **LSD 75** [2018. 11. sz.] c. tömörítvény zárszava szerint: „Az utóbbi időben ismét felélénkült az LSD iránti tudományos érdeklődés. **Dr. Peter Gasser svájci pszichiáter** kivételes hatósági engedéllyel annak járt utána, hogy miként segíthetne az LSD rákos és más halálos megbetegedésekben szenvedő személyeken. Kutatásának eredménye, hogy a szer a betegek 78%-ánál csökkenti a szorongásos állapotokat, 67%-nál pedig javítja az életminőséget.” Azóta az események felgyorsultak. Az intézet, ahol Dr. Albert Hofmann 1943. április 16-án felfedezte az LSD-t, mára az egyetemi LSD-kutatás világviszonylatban vezető központjává nőtte ki magát. **Dr. Felix Müller, a kábítószeres terápia hatásával foglalkozó kutatócsoport vezetője (Univerzität Basel)** 2022-ben kimutatta, hogy két dózis LSD tartósan csillapíthatja a szorongást. [[felix.mueller@upk.ch](mailto:felix.mueller@upk.ch) ; Tel: +41 61 325 5111]

Az LSD depresszió esetén történő alkalmazásáról szóló vizsgálat eredményeit 2023. április 14-én ismertették. A felmérés keretében 61 beteget kezeltek alacsony-közepes-magas dózisú LSD-vel. Sem a betegeknek, sem a

kezelőorvosoknak nem volt tudomásuk arról, hogy ki melyik csoportba tartozik (randomizált, kettős-vak vizsgálat, parallel-csoport). A kezelés során a betegek négy hetente két alkalommal kapták meg szokásos LSD-dózisukat. 100 vagy 200 mikrogramm LSD beadása a kezelést követően két héttel és még három hónappal is csökkentette a depressziós tüneteket. A kutató összegzése szerint: Két mérsékelt vagy magas dózis LSD két alacsony dózishoz viszonyítva szignifikánsan csökkenti a depressziós tüneteket. A tanulmányt még nem kontrollálták szakértők és az nem jelent meg szakfolyóiratban. Bazelben folyamatban van egy másik kutatás is, amely az LSD cluster fejfájás esetén való alkalmazásával foglalkozik.

A «*Cell*» c. szakfolyóiratban 2020-ban a pszichiátria pszichedelikus forradalmáról értekeztek. Egyebek között a hallucinogének, mint a Pszilobicin, a varázsgombák aktív hatóanyaga, vagy az LSD terápiás hatásáról. Több elitegyetemen, mint az amerikai *Johns Hopkins University*, vagy az *Imperial College London* pszichedelikumokat kutató központot létesítettek. 2019-ben, a londoni intézet megnyitóján **Robin Carhart-Harris professzor** az orvostudomány legizgalmasabb területének nevezte a pszichedelikumok kutatását.

**Michael Bogenschutz, a New York University Langone Center for Psychedelic Medicine igazgatója** az európai pszichiátriai kongresszuson kifejtette, hogy már 5.000 évvel ezelőtti a rituálékon is alkalmaztak pszichedelikus hatóanyagokat. A közelmúltig nem állt rendelkezésre elegendő bizonyíték ezek hatékonyságára. Kivételt képezett az LSD, amellyel kapcsolatban 1955 és 1975 között több mint 1.000 klinikai vizsgálatot végeztek több mint 40.000 alannyal. A kutatások hosszú megszakítás után két-három éve lendültek fel és a kontrollált klinika vizsgálatok száma gyorsan növekedett.

Bogenschutz a kongresszus „*Best of 2022*“ szekciójában több pszilobicinnel és MDMA-val (ecstasy) végzett vizsgálatot idézett. Egy 2019-ben publikált, hat kisebb vizsgálat eredményeit összegző tanulmány 103 poszttraumás stressz zavarban szenvedő beteg kezelését elemezte, akiknél az MDMA adagolása már két ülést követően a CAPS-IV-skálán való 30,4 pontos csökkenést eredményezett, szemben a placebo-csoportnál regisztrált 10,5 ponttal. [<https://link.springer.com/article/10.1007/s00213-019-05249-5> ]