

*A gyermekági halálozás trendjei a faji és etnikai csoportok körében
1999 és 2019 között az Egyesült Államokban*
JAMA 2023; DOI: 10.1001/jama.2023.9043

Kulcsszavak: szülészet-nőgyógyászat, gyermekági halálozás, Egyesült Államok

Forrás Internet-helye:

<https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2806661> ;
<https://www.healthdata.org/news-release/maternal-mortality-us-more-doubled-between-1999-and-2019>

Gregory Roth (Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Washington, Seattle) és mt. tanulmánya szerint a gyermekági halálozás az Egyesült Államokban, amely már régóta magasabb mint más országokban, az elmúlt két évtized során több mint duplájára növekedett. Legsúlyosabban az afroamerikaiak és a „natív amerikaiak” érintettek, de a gyermekági halálozások száma a hispán, ázsiai származású és európai származású „fehér” amerikaiak körében is növekedett.

Az Egyesült Államokban 1999-ben (legalább) 505 nő halt meg a terhesség idején vagy azt követően egy éven belül. A gyermekági halálozás rátája 100.000 lakosra 12,1 haláleset volt. 2019-ben 1.210 haláleset következett be; 100.000 lakosra 32,2 haláleset.

Az Egészségügyi Világszervezet legújabb jelentése szerint Venezuela, Ciprus, Görögország, Mauritius, Puerto Rico, Belize és a Dominikai Köztársaság mellett az Egyesült Államok azon kevés ország közé tartozik, ahol a gyermekági halálozás növekedik.

Ez nem minden esetben a rossz egészségügyi ellátásnak tulajdonítható. A „Centers for Disease Control and Prevention“ (CDC) szerint az esetek 23%-ánál pszichés okok (öngyilkosság, kábítószer-túladagolás/mérgezés) játszanak közre. További halálokok: vérzések (14%), szív- és koronáriás megbetegedések (13%), fertőzések (9%), tromboembóliák (9%), kardiomiopátia (9%), terhességi magas vérnyomás (7%). Ezek egyes okai: az elhízottság növekvő prevalenciája, magas vérnyomás, 2-es típusú diabétesz, amelyek abból következnek, hogy a nők egyre magasabb életkorban lesznek terhesek.

A gyermekági halálozás rátája az „American Indian and Alaska Natives” csoportnál 100.000 lakosra 14,0-ról 49,2-re, az európai származású „fehér” amerikaiaknál 9,4-ről 26,3-ra, a „hispánoknál” 9,6-ról 19,1-re, az ázsiai származásúaknál 9,6-ról 20,9-re növekedett.

[Lásd még: *Gyermekági halálozás az Egyesült Államokban 2020-ban*, 2022. 6. sz.]