Az öngyilkosság incidenciája az amerikai orvosok körében

JAMA Psychiatry. Published online February 26, 2025.
doi:10.1001/jamapsychiatry.2024.4816

Kulcsszavak: halálozás, öngyilkosság, hivatásrend, orvosok, Egyesült Államok

Forrás Internet-helye:
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2830401 ;
Kapcsolódó: Öngyilkosságot elkövető francia orvosok és ápolók 19 hozzátartozója pert indított Catherine Vautrin egészségügyi és Élisabeth Borne felsőoktatási miniszter ellen (RFI, 14/04/2025 - 17:03): https://www.rfi.fr/en/france/20250414-french-ministers-face-legal-action-over-hospital-staff-suicides ;

Hirsh Makhija (Department of Psychiatry, University of California San Diego School of Medicine, La Jolla) és mt. az öngyilkosság gyakoriságát vizsgáltak a 25 év fölötti amerikai orvosnők és orvosok körében a 2017 január és 2021 december közötti időszakban. Értékelésük szerint az amerikai orvosnők körében az öngyilkosság gyakoribb, mint azon nők körében, akik nem orvosok. Egy a BMJ-ben 2024-ben közölt tanulmány már azt is kimutatta, hogy az orvosnők gyakrabban követnek el öngyilkosságot, mint a férfi orvosok. Továbbá az orvosnők körében 76%-kal gyakoribb az öngyilkoság, mint az általános lakosság körében. Ezzel szemben az öngyilkosság kockázata a férfi orvosoknál megegyezik az általános lakosságéval.

Adatforrás gyanánt a harminc amerikai szövetségi államban és Washington DC-ben vezetett ***National Violent Death Reporting System*** szolgált.

2017-ben (incidence rate ratio: IRR 1,88) és 2019-ben (IRR 1,75) az öngyilkosság rátája az orvosnők körében magasabb volt mint nem orvosnőknél. Az öngyilkosság kockázata 2017 és 2019 között összességében magasabb volt (IRR 1,53). A férfi orvosok körében viszont 2017 és 2021 között az öngyilkosság kockázata alacsonyabb volt mint nem orvos férfiaknál (IRR 0,84).

Az általános lakossághoz viszonyítva az orvosok körében magasabb az öngyilkosságot megelőző depresszív hangulat (adjusted Odds Ratio: aOR 1,35; $p < 0,001$), a lelki problémák (aOR 1,66; $p < 0,001$), szakmai nehézségek (aOR 2,66; $p < 0,001$) és jogi problémák (aOR 1,40; $p = 0,02$) valószínűsége.

Az orvosok körében a mérgezés (aOR 1,85; $p < 0,001$) és hatékonyabb eszközök (aOR 4,58; $p < 0,001$) valószínűsége magasabb. A kórházban rendelkezésre álló gyógyszerek és mérgek befolyásolják az öngyilkosság módozatát.

[*Lásd még: Az öngyilkosság kockázata az amerikai egészségügyi személyzet körében; Longitudinális elemzés az amerikai gyógyszerészek körében 2003 és 2018 között elkövetett öngyilkosságokról, 2023. IV. negyedév 1. sz.*]