Akut alkoholfogyasztás és öngyilkosság
Dél-Koreában 2013 és 2020 között

JAMA Netw Open. 2025;8(2):e2461409.
doi:10.1001/jamanetworkopen.2024.61409

Kulcsszavak: halálozás, öngyilkosság, alkoholfogyasztás, Dél-Korea

Forrás Internet-helye:
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2830552

Az 55.226 öngyilkossági esetre kiterjedő elemzés szerint az érintettek 39,8%-a a halál időpontjában alkohol befolyása alatt volt. Ezek között magas volt a középkorú férfiak aránya. A tanulmány elsősorban időskorú személyek esetén szignifikáns összefüggést állapított meg az alkoholfogyasztás és gázmérgezés, mint az öngyilkosság módozata között.

Összegzés:

- Az akut alkoholfogyasztás férfiak (odds ratio [OR], 1,37; 95%-konfidenciaintervallum [KI], 1,31-1,44) és 30-39 év közöttiek (OR, 1,20; 95 %-KI, 1,06-1,35) körében volt szignifikáns; a legerőteljesebb összefüggés az alkoholfogyasztási zavar tüneteinél mutatkozott (OR, 13,28; 95%-KI, 12,38-14,24).
- Az elkövetés módozatai tekintetében az asszociáció a gázmérgezés és akut alkoholfogyasztás között volt a legerőteljesebb (OR, 1,88; 95%-KI, 1,61-2,20), ezt követték a gyógyszerek és növényvédő szerek.
- Időskorú felnőtteknél (≥ 80 év) az öngyilkosság bizonyos módozatai tekintetében az akut alkoholfogyasztás elsősorban gyógyszer (OR, 6,28; 95%-KI, 3,53-11,17), növényvédő szer (OR, 6,56; 95%-KI, 3,86-11,13) és gázmérgezés (OR, 2,48; 95%-KI, 1,52-4,04) melletti alkalmazásának esélye a legmagasabb.
- A szerzők szerint az akut alkoholfogyasztás és a gázmérgezés közötti összefüggés arra utalhat, hogy az alkohol tudatosan szolgál a tervezett öngyilkossági kísérlet megkönnyítésére.