A terhes nők lítiumterápiája 2000 és 2021 között a világ 14 országában
JAMA Netw Open. 2024;7(12):e2451117. ; December 16, 2024

Kulcsszavak: szülészet-nőgyógyászat, terhesgondozás, lítiumterápia, nemzetközi

Forrás Internet-helye:
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2828074
Aktuális kapcsolódó: JNLF : journées de neurologie de langue française 15.04-18. 04. 2025 Clermont-Ferrand. Sophie Dupont, MD, PhD (az Hôpitaux Universitaires Pitié Salpêtrière neurológiai rehabilitációs osztályának vezetője) tanulmánya az antiepileptikumok terhes nőknél való alkalmazásának kockázatairól: https://www.univadis.fr/viewarticle/jnlf-2025-anti-%C3%A9pileptique-et-grossesse-conna%C3%AEt-2025a1000aeu , univadis.fr. Publié 6 mai 2025

A Lítiumtablettát elsősorban súlyos pszichiátriai betegségek, bipoláris zavarok, recidiváló depressziós zavarok és skizoaffektív zavarok esetén alkalmazzák. Egy 2022-ben készült metaanalízis szerint a perinatális időszakban nagyjából minden negyvenedik nő szenved bipoláris zavarban. Ennek ellenére a Lítium alkalmazása tekintetében eddig nem fogadtak el nemzetközi szinten érvényes irányelvet.
Egy a ***Karolinska Institutet*** által koordinált nemzetközi kutatócsoport megvizsgálta a Lítium alkalmazásának gyakoriságát az elmúlt két évtizedben a világ 14 országában.

Eredmények

- A vizsgálat időtartamának utolsó három évében tíz országban gyakrabban alkalmaztak Lítiumot, mint az első három évben (Ausztrália: 0,60 vs. 0,74; Dánia 0,09 vs. 0,51; Finnország 0,10 vs. 0,29; Izland 0,24 vs. 0,99; Izrael 0,25 vs. 0,37; Norvégia 0,24 vs. 0,47; Dél-Korea 0,30 vs. 0,44; Svédország 0,42 vs. 1,07; Nagy-Britannia 0,07 vs. 0,10; Tajvan 0,15 vs. 0,19).
- A Lítium alkalmazása a vizsgálat utolsó három évében az első három évhez viszonyítva nem változott (Németország 0,17 vs. 0,16; Hong Kong 0,06 vs. 0,06; US-MAX 1,50 vs. 1,34, US-MarketScan 0,38 vs. 0,36).
- Egyetlen olyan ország volt, ahol a vizsgálat utolsó három évében a Lítiumot ritkábban alkalmazták, mint az első három évben (Új-Zéland: 0,54 vs. 0,39).
- A Lítium alkalmazásának legnagyobb mértékű növekedését az északi országokban regisztrálták. A Lítium alkalmazásának prevalenciája az országok többségében (Ausztrália, Dánia, Finnország, Németország, Hong Kong, Izland, Izrael, Új-Zéland, Norvégia, Svédország, Nagy-Britannia) a 35 év fölötti terhes nők körében volt a legmagasabb.
- A Lítium alkalmazásának prevalenciája a terhesség mindhárom trimeszterében alacsonyabb volt, mint a terhesség előtt, a posztpartális időszakban pedig ismét megnövekedett.
- A terhes nők 32/55/56%-a szedett antiepileptikumot/antipszichotikumot/ antidepresszánsokat. Az antiepileptikumok szedésének szélső értékei: Nagy-Britanniában a terhes nők 5%-a, Tajvanon 65%-a. Az antipszichotikumok szedésének szélső értékei: Nagy-Britanniában a terhes nők 3%-a, Dél-Korában 79%-a. Az antidepresszánsok szedésének szélső értékei: Izraelben a terhes nők 33%-a, az Egyesült Államokban 75%-a (US MAX).