A krónikus obstruktív tüdőbetegség és az asztma helyzete a WHO Európai Régiójában
World Health Organization European Region, 12. June 2025 (168 p.)

Kulcsszavak: globális egészségügy, népegészségügy, légúti betegségek, Európa, WHO Európai Régiója

Forrás Internet-helye: https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2025-12340-52112-79990 ;

A ***WHO Europe*** és a ***European Respiratory Society*** jelentése szerint a régióban 81,7 millió ember szenved krónikus légúti megbetegedésekben. Ezek közé tartoznak a krónikus obstruktív tüdőbetegség, az asztma és más légúti betegségek. Évente 6,8 millió új eset diagnosztizálására kerül sor.

Az Egészségügyi Világszervezet Európai Régiójában a krónikus légúti betegségek a hatodik leggyakoribb halálokot képezik. Évente 400.000 krónikus légúti betegség okozta haláleset következik be, amelyek 80%-át krónikus obstruktív tüdőbetegség okozza. A halálesetek többsége megelőzhető kockázati tényezőknek, elsősorban dohányzásnak és légszennyezésnek tulajdonítható. A dohányzás rátája a régióban világviszonylatban a legmagasabbak közé tartozik; a felnőttek egynegyede dohányos és az emberek 90%-a veszélyes mennyiségű finomporral terhelt levegőt lélegez be.

A jelentés rámutat egy politikai paradoxonra: A korábbi előrelépések a légúti megbetegedések okozta halálozás csökkenéséhez vezettek, amiből aztán a kutatások finanszírozásának és a surveillance csökkenése következett.

Más nem fertőző betegségekhez viszonyítva, amelyek esetében számos epidemiológiai tanulmány hívja fel a figyelmet a globális betegségteherre, a légúti betegségek kutatására fordított költségek csökkentek, csak néhány bizonyítékokon alapuló tanulmány készült.

A krónikus légúti betegségek kellő időben való diagnosztizálását az egészségügyi rendszer és az orvosi személyzet előtt álló számos kihívás akadályozza. Ezek közé tartoznak a más légúti betegségekkel való átfedő tünetek, a gyakori komorbiditások, az orvosok korlátozott ismeretei, elsősorban az elsődleges egészségügyi ellátás területén, a diagnosztikai eszközökhöz való hozzáférés és a betegek tudatosságának hiánya, ami együttesen alul- és túldiagnosztizálást eredményez és késlelteti a kezeléshez való hozzáférést.

Philip Bardin, professzor (Monash University and Medical Centre Melbourne) és ***Peter Burney professzor (National Heart and Lung Institute, Imperial College London)*** egybehangzóan állítja, hogy a krónikus légúti betegségek jelentőségének a lakosság körében már régóta nem szentelnek kellő figyelmet.