Kábítószerfogyasztással összefüggő zavarok a világ 204 országában 1990 és 2021 között – Global Burden of Disease (GBD) Study 2021

Frontiers in Psychiatry Volume 16 - 2025
(2025; DOI: 10.3389/fpsyt.2025.1647269) ; 01 October 2025

Kulcsszavak: globális egészségügy, népegészségügy, szenvedélybetegségek, kábítószer, kábítószerfogyasztással összefüggő zavarok, lelki egészség, Global Burden of Disease Study (GBD), nemzetközi

Forrás Internet-helye:
https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2025.1647269/full

Ning Zhang (Jinshan Hospital, Fudan University Shanghai) és mt. a ***Global Burden of Disease Study 2021*** adatai alapján elemezték a kábítószerfogyasztással összefüggő zavarokat (*drug use disorders – DUDs*). Az 1990 és 2021 közötti időszakra kiterjedő vizsgálat az opioidokra, cannabisra, kokainra, amfetaminokra és más szerekre fókuszált.

A kábítószerfogyasztással összefüggő halálesetek száma 1990 és 2021 között világviszonylatban több mint megduplázódott, jóllehet a kábítószerrel összefüggő zavarok életkorral standardizált incidenciája és prevalenciája enyhén csökkent.

A kábítószerrel összefüggő zavarok (DUDs) új eseteinek száma 1990 és 2021 között 36%-kal, 10,04 millióról 13,61 millióra növekedett. Ugyanebben az időszakban a prevalencia világviszonylatban 34%-kal, 39,62 millióról 53,12 millióra növekedett.

Az 1990-2021 közötti népességnövekedés (+50%) figyelembevételével az életkorral standardizált prevalencia 6%-kal, 100.000 lakosra 709,2-ről 663,8 esetre csökkent.

A prevalencia csökkenése ellenére a globális halálozási ráta 31%-kal – 100.000 lakosra 1,26-ról 1,65 halálesetre növekedett. A kábítószerfogyasztással összefüggő halálesetek száma megduplázódott, évente 61.774-ről 137.278-re növekedett. Az elvesztett egészséges életévek (*Disability-Adjusted Life Years – DALYs*) száma 75%-kal, 8,9 millióról 15,6 millióra növekedett.

Az incidencia, a prevalencia és a halálozás rátája összességében a magas szocioökonómiai index-szel (SDI) rendelkező országokban magasabb. A kábítószerfogyasztással összefüggő halálesetek száma Észak-Amerikában – elsősorban az Egyesült Államokban – 1990 és 2021 között 11,2-szeresére, évente 74.451-re növekedett.

A kábítószerfogyasztással összefüggő zavarok prevalenciája 2021-ben világviszonylatban az Egyesült Államokban volt a legmagasabb (100.000 lakosra 3.821 eset). A prevalencia Nyugat-Európában ugyanebben az időszakban 7%-kal (100.000 lakosra 1.201 esetre) növekedett.