

Jelentés az alkoholfogyasztásról a pandémia idején

OECD, 2021. május 19.

Kulcsszavak: globális egészségügy, népegészségügy, járványügy, pandémia, koronavírus, COVID-19, alkoholfogyasztás, Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD)

Forrás **Internet-helye:** https://www.oecd-ilibrary.org/sites/6e4b4ffb-en/1/2/3/index.html?itemId=/content/publication/6e4b4ffb-en&_csp_=2c8abebfcd351c6cf1626284896818ce&itemIGO=oecd&itemContentType=book

A *Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD)* tanulmánya 52 országra: az OECD és az Európai Unió tagállamaira, valamint a G20-akra terjedt ki.

A jelentés szerint a pandémia sok ember italozási szokásait megváltoztathatta. Már más korábbi válságok tapasztalatai is azt mutatták, hogy ez a helyzet a problematikus alkoholfogyasztás növekedéséhez vezethet. A szakértők szerint azonban „a jelenlegi pandémia a kóros alkoholfogyasztással összefüggő számos problémára rávilágított – egyebek között a családi környezetben való alkoholizálásra”. Összességében az emberek nem isznak többet, de akik igen, azok sokkal többet. És az ivászatok gyakorisága is megnövekedett.

A kóros alkoholfogyasztás az idő előtti halálozás, a sérülések, a rákos megbetegedések és a májcirrózis fő okai közé tartozik. A szakértők előzetes becslései szerint az összesített alkoholforgalom 2020-ban 2019-hez viszonyítva Németországban, Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban 3-5%-kal növekedett.

A pandémia miatt megváltoztak az ivászatok helyszínei. A bárók és éttermek bezárása miatt felfutott a kiskereskedelem és az italfutárok forgalma. Az első információk szerint a pandémia nem változtatta meg jelentős mértékben az italozás valószínűségét.

Az elemzések szerint az elkövetkező harminc év során, nőknél napi több mint egy ital, férfiaknál napi másfél ital fogyasztása esetén, az alkoholfogyasztással összefüggő betegségek és sérülések miatt, a várható élettartam egy évvel csökken.

Ezek a betegségek és sérülések átlagosan az éves egészségügyi költségek 2,4%-ának megfelelő egészségügyi költségeket okoznak – egyes országokban ennél is többet. Ezenkívül pedig rontják a dolgozók termelékenységét.