

A pandémia hatása a várható élettartamra az Egyesült Államokban

BMJ, 2021; DOI: [10.1136/bmj.n1343](https://doi.org/10.1136/bmj.n1343)

Kulcsszavak: globális egészségügy, népegészségügy, járványügy, pandémia, koronavírus, COVID-19, várható élettartam, halálozás, Egyesült Államok

Forrás Internet-helye: <https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1343>

Steven Woolf (director emeritus, Center on Society and Health, Virginia Commonwealth University School of Medicine, Richmond, VA, USA) és mt. tanulmánya szerint az Egyesült Államokban a pandémia kezdete óta több mint 600.000 ember halt meg COVID-19 miatt, a lakosság várható élettartama pedig 1,87 évvel csökkent. A várható élettartam az afroamerikai lakosság körében 3,25 évvel, a hispán származásúak körében 3,88 évvel csökkent.

A várható élettartam 1950-ben még az Egyesült Államokban volt a legmagasabb. A fertőző betegségek leküzdése, az új kezelési eljárások bevezetése és a tömeges oltási programok a halálozás jelentős csökkenéséhez vezettek. Ez a trend az 1950-es évek közepétől 1970-ig mérséklődött, majd ezt követően a „kardiovaszkuláris forradalommal”, a dohányzással összefüggő kockázati tényezők csökkentésével, a magas vérnyomás és a koleszterinértékek gondosabb kezelésével a várható élettartam ismét növekedésnek indult. A várható élettartam 2010. óta, egyebek között az opiátválsággal összefüggésben, a fájdalomcsillapítók orvosok és fogorvosok általi könnyelmű felírása miatt ismét stagnálni kezdett.

Az *Egészségügyi Világszervezet* adatai szerint a férfiak várható élettartama tekintetében az Egyesült Államok jelenleg a 41. helyen áll, holtversenyben Peruval, Kolumbiával, Chilével, Horvátországgal és Thaifölddel, nőknél pedig a 42. helyen, valamivel megelőzve Kínát, Kubát és Törökországot.

A várható élettartam az Egyesült Államokban a következő években, a koronavírus-válsággal összefüggésben tovább csökkenhet. *Steven Woolf és mt.* számításai szerint a várható élettartam 2018 és 2020 között férfiaknál 2,16 évvel, nőknél 1,50 évvel csökkent.

Tizenhat hasonló fejlettségű országgal összehasonlítva az derül ki, hogy a különbség növekedett. 2010-ben az amerikaiak 1,88 évvel korábban haltak, mint a referencia-országokban. A különbség 2018-ig 3,05 évre, 2018 és 2020 között pedig 4,69 évre növekedett. A várható élettartam 1,87 évvel való csökkenése az Egyesült Államokban 8,5-szer magasabb volt, mint az átlagos csökkenés a referencia-országokban, ahol a várható élettartam a koronavírus-válság miatt 0,22 évvel csökkent.

Correspondence to: S H Woolf steven.woolf@vcuhealth.org (@shwoolf Twitter)