

***Az egészségügyi személyzet pszichés megterhelése  
a koronavírus-pandémiával összefüggésben***

Journal of Psychosomatic Research ;

Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, December 18, 2020

**Kulcsszavak:** globális egészségügy, népegészségügy, járványügy, pandémia, koronavírus, COVID-19, egészségügyi személyzet, pszichés megterhelés, Németország

**Forrás Internet-helye:** <https://www.fau.eu/2020/12/18/news/research/current-research-improves-working-conditions-for-health-workers/>

**Prof. Dr. (TR) Yesim Erim (Head of Department of Psychosomatic Medicine and Psychotherapy Erlangen) és mt.** a 2020 április és június közötti időszakban, a bonni, drezdai, kölni és ulmi egyetemi klinikák pszichoszomatikus osztályaival együttműködésben összesen 8.071 egészségügyi dolgozót kérdeztek meg a koronavírussal összefüggő pszichés megterhelésről, akik közül 3.060 fő az öt egyetemi klinika alkalmazottja volt.

A pandémia első szakaszában az ápoló- és orvostechnikai személyzet pszichikai megterhelése magasabb volt az orvosokénál. A kutatás eredményei szerint a depressziók és szorongásos állapotok prevalenciája az orvosnőknél 17,4%, az orvosoknál 17,8%, az ápolónőknél 21,6%, a férfi ápolóknál 19,0% volt. Az orvostechnikai személyzet körében a pszichikai megterhelés prevalenciája nőknél 23,0%, férfiaknál 20,1% volt. Az *Universitätsklinikum Erlangen* sajtóközleménye szerint ez azt jelenti, hogy a pszichés megterhelés nemcsak a frontvonalban, hanem a teljes rendszerben jelen van.

2020. november 16-án elkezdődött a megkérdezés második hulláma, amelyben még több egészségügyi alkalmazott vesz részt.

**Tel.: +49 9131 85-35928**