

*Három tanulmány a pandémia orvosi tevékenységre gyakorolt hatásáról*  
*Joachim Szecsenyi et al.: Jelentés az orvosi tevékenység helyzetéről a pandémia idején*  
*BARMER Arztreport 2022*

BARMER Institut für Gesundheitssystemforschung (bifg)  
Schriftenreihe zur Gesundheitsanalyse – Band 33 (165 p.) ;  
*A pandémia hatása a gyermekorvosok tevékenységére*  
Archives of Public Health, 2022; DOI: [10.1186/s13690-022-00876-5](https://doi.org/10.1186/s13690-022-00876-5)  
*A pandémia hatása az orvosi tevékenységre*  
Stiftung Gesundheit, 2022. 04. (9 p.)

**Kulcsszavak:** hivatásrend, orvosi tevékenység, pandémia, Németország

**Forrás Internet-helye:** Az összes BARMER Arztreport 2010. óta:

[https://www.bifg.de/publikationen/reporte/arztreport-2022?utm\\_source=newsletter&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=Newsletter+04%2F2022](https://www.bifg.de/publikationen/reporte/arztreport-2022?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+04%2F2022) ; <https://www.stiftung-gesundheit.de/pdf/studien/beeintraechtigt-covid-arbeit.pdf> ; <https://archpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13690-022-00876-5>

A **BARMER** biztosító adatai szerint 2020-ban a lakosság 92,68%-a részesült ambuláns orvosi ellátásban; az előző évben 93,31%, az azt megelőző években pedig több mint 90%. 2020-ban az ambuláns ellátás keretében egy főre átlagosan 8,27 kezelési esetet számoltak el, 4,4%-kal kevesebbet mint a pandémia előtti évben.

2020-ban összességében az általános orvos és belgyógyász háziorvosok rendelkeztek a legtöbb orvos-beteg kontaktussal: a lakosság 61,2%-át, ill. 31,0%-át kontaktálták. Az elszámolt kezelések aránya az előző évhez viszonyítva 8,1%-kal, a betegpénztárakkal elszámolt költségeké 4,3%-kal csökkent. Az elszámolt esetszám sebészeknél és fül-orr-gégészeknél több mint 10%-kal, szemorvosoknál 9%-kal csökkent. Az elszámolt szolgáltatások értéke csak a radiológia-nukleáris medicina területén csökkent erőteljesebben az elszámolt esetekénél (7,4%). 2020-ban az elszámolt szolgáltatások száma sebészeknél, szemorvosoknál és fül-orr-gégészeknél az előző évhez viszonyítva 5,7%-kal, 7,6%-kal és 7,9%-kal csökkent.

A szociálpédiátria területén végzett multicentrikus vizsgálatra a **VOICE-Study** keretében került sor. A 2020 június-júliusban végzett online-felmérésben a szociálpédiátriai ellátás területén működő 1.291 szakértőt (gyermekorvosokat, pszichológusokat, logopédusokat, ergoterapeutákat) kérdeztek a megterheltségről és a lelki egészség helyzetéről. A fejlődési zavarokban szenvedő és hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó szakdolgozói személyzet 44,5%-a válaszolta, hogy összességében igen magas megterheltségnek van kitéve. Ez az érték a pandémia előtt 13,4%-on állt. 14,6%-nak klinikailag szignifikáns depresszív tünetei, 17,0%-nak általános szorongásos zavarai voltak, 44,6% érzelmileg kimerült volt. 20,6% fél a fertőződéstől, 41,9% családtagjai megfertőződésétől.