

*Az ambuláns és pszichoterápiás onkológiai  
ellátás helyzete Németországban. Trendek 2010 és 2019 között*

Versorgungsatlas.de – Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi)

Bericht Nr. 21/11, 02. 12. 2021 (46 p.)

**Kulcsszavak:** népegészségügy, rákos megbetegedések, onkológia, ambuláns ellátás, onkológiai pszichoterápia, Németország

**Forrás Internet-helye:**

[https://www.versorgungsatlas.de/fileadmin/ziva\\_docs/114/VA\\_21-11\\_Bericht\\_Amb\\_Onkologie\\_2021-12-02.pdf](https://www.versorgungsatlas.de/fileadmin/ziva_docs/114/VA_21-11_Bericht_Amb_Onkologie_2021-12-02.pdf) ;

<https://www.versorgungsatlas.de/themen/alle-analysen-nach-datum-sortiert?tab=6&uid=114> ;

A szövetségi szintű értékelés a szerződött orvosok 2010 és 2019 közötti elszámolásain alapult. Az adatállomány a kötelező betegebiztosítás mindazon biztosítottjára kiterjedt, aki ebben az időszakban elszámolásra jogosult orvoshoz vagy pszichoterapeutához fordult.

A kötelező betegebiztosítás biztosítottjai körében az ambuláns szektorban diagnosztizált rákos megbetegedések száma 2010 és 2019 között növekedett. A kötelező betegebiztosítás 61,5 millió tizenöt év fölötti tagja közül 2019-ben szűk 3,32 millió személynél diagnosztizáltak legalább két negyedévben biztosan dokumentált rákos megbetegedést. Ez az összes rákos megbetegedés körében, a fehér bőrrák kivételével, 5,2%-os életkor szerint standardizált prevalenciának felel meg. 2010-ben a prevalencia 4,1% volt.

A vizsgálat szerint számos rákos megbetegedés gyakorisága az életkorral növekedik. Ez a megoszlás csaknem minden rákos megbetegedésnél megfigyelhető. Kivételt képeznek: a hererák, a méhnyakrák és a pajzsmirigyrák. Ezenkívül a nemek között is különbségek mutatkoznak.

A nemtől független ráktípusok gyakrabban fordulnak elő férfiaknál mint nőknél. Miközben azonban 2019-ben a rosszindulatú melanóma tekintetében a különbség rendkívül alacsony volt, a hólyagrák prevalenciája tekintetében az arány férfiaknál igen kedvezőtlenül alakult. Másrészt sokkal több nő szenved pajzsmirigyrákban.

Ezek a betegek egyre több ambuláns szerződött orvosi és pszichoterápiás szolgáltatást vesznek igénybe, ami hatalmas kihívást jelent az egészségügyi rendszer teljes spektruma számára.

A kutatók a tanulmányban a rákos megbetegedések 20 különböző entitásának és entitáscsoportjának nyers és életkor szerint standardizált prevalenciáját számították ki a kötelező betegebiztosítás 15 éven felüli biztosítottjai körében.

**Claudia Kohring**, Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi)  
Tel. 49-30-4005 2433 ; E-Mail: [CKohring@zi.de](mailto:CKohring@zi.de)