

Lelki egészség és demencia Új-Zélandon

JAMA Psychiatry. 2022 Feb 16:e214377. doi: [10.1001/jamapsychiatry.2021.4377](https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2021.4377).

Kulcsszavak: népegészségügy, lelki egészség, demencia, Új-Zéland

Forrás Internet-helye:

<https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2789298>

A pszichés zavarokra, Alzheimer-kórra és a demencia egyéb formáira irányuló lakossági regisztervizsgálat keretében figyelembe vett adatok az individuális szinten egymással összekapcsolódó új-zélandi adminisztratív adatbázisok gyűjteményéből (*New Zealand Integrated Data Infrastructure*) származnak. A felmérés 1.711.386 személyre terjedt ki, akik 1929 és 1967 között Új-Zélandon születtek és az 1988 július és 2018 június közötti megfigyelés időtartama alatt az országban éltek.

Eredmények

- A demenciában való megbetegedés relatív kockázata (RR) a valamely pszichés megbetegedésben szenvedők körében több mint négyszer akkora volt, mint azoknál, akik nem szenvedtek ilyen betegségben (RR = 4,24; 95%-konfidenciaintervallum 4,07 – 4,42).
- A valamely pszichés zavarban szenvedők körében átlagosan 5,60 évvel (95%-KI 5,31 – 5,90) korábban diagnosztizálták a demenciát.
- Ezek az asszociációk függetlenek a nemtől és az életkortól, akárcsak a krónikus kórelőzményektől és a szocio-ökonómiai hátrányos helyzettől.
- Az asszociációk kiterjedtek a mentális megbetegedések és az önpusztító viselkedés minden formájára, a relatív kockázat 2,93 (neurotikus betegségképek) és 6,20 (pszichotikus zavarok) között mozgott. Ennek során az Alzheimer-demenciában való megbetegedés kockázata 2,76-szoros nagyságrendben (95%-KI 2,45 – 3,11), az egyéb demenciákban való megbetegedése 5,85-szoros nagyságrendben (95%-KI 5,58 – 6,13) növekedett.

Finanszírozás: National Institute on Aging, UK Medical Research Council, National Institute of Child Health and Development.