

***Pszilobicin alkalmazása a szorongás és depresszió
kezelésére rákos betegeknél***

International Journal of Gynecological Cancer
(2023; DOI: [10.1136/ijgc-2023-004659](https://doi.org/10.1136/ijgc-2023-004659))

Kulcsszavak: gyógyszer, rákos megbetegedések, lelki egészség, szorongás, depresszió, Egyesült Államok

Forrás Internet-helye:

<https://ijgc.bmj.com/content/early/2023/06/13/ijgc-2023-004659> ;

The University of Texas. MD Anderson Cancer Center:

<https://www.mdanderson.org/>

A *University of Texas, Anderson Cancer Center* kutatói a pszilobicin és más pszichedelikus szerek alkalmazását szorgalmazzák a rákellenes terápiák területén. Indokuk nem a fájdalomcsillapítás, hanem a szorongás, a depresszió és a betegség egyéb lelki következményeinek oldása.

A krónikus mellékhatások, a kései stádiumban körvonalazódó sötét kilátások főleg nők körében gyakran vezetnek elbizonytalanodáshoz, és folyamatos halálfélelemhez. A szerzők szerint a petefészekrákban szenvedő betegek mintegy egynegyede számol be depresszióról, szorongásos állapotokról és halálfélelemről. Ehhez a hagyományos pszichoterápiás eljárások, mint a kognitív viselkedésterápia, túl sok időt vesznek igénybe és túl nagy kitartást követelnek.

A szerzők által ismertetett egyik esetben pl. egy előrehaladott petefészekrákban szenvedő fiatal nő súlyos szorongásban szenvedett, semmilyen túlélési esélye nem volt, de sem ideje, sem kitartása nem volt már ahhoz, hogy a rendelkezésre álló terápiás opciókkal csillapíthassák szenvedéseit.

A pszichedelikumok, elsősorban a pszilobicin nagyban segíthetik a szorongásos állapotok, a depresszió, a poszttraumás stressz szindróma és a végstádiumban jelentkező stressz kezelését.