

## *Jelentés a legionellózis helyzetéről Európában*

### ECDC SURVEILLANCE REPORT

Legionnaires' disease. Annual Epidemiological Report for 2021 (12 p.)

**Kulcsszavak:** népegészségügy, fertőző betegségek, legionellózis, Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Európai Gazdasági Térség, Európa

**Forrás Internet-helye:** <https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/increasing-rates-legionnaires-disease-eueea> ; <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/legionnaires-disease-annual-epidemiological-report-2021>

A *European Surveillance System (TESSy)* 2021-ben összesen 10.723 legionellózis-esetet regisztrált az Európai Gazdasági Térségben. Az *Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC))* jelentése szerint az esetek háromnegyede Olaszországra, Franciaországra és Németországra jutott. A gyakoriság csúcsa minden évben az utazási főszezonra, júliusra esik. Ez ugyan nem éri el az elmúlt évek abszolút értékét, a 100.000 lakosra jutó éves ráta (2,4) azonban csúcsot döntött.

A pandémia első évében, amikor a legtöbben lemondtak a nyaralásról, a megbetegedések száma Európában csökkent. Akkor 8.434 esetet regisztráltak. Az esetszám 2019-ben még 11.373 volt (ebből 517 Nagy-Britanniából, amely 2020. óta már nem jelenti be az eseteket).

Az esetszám 2020-ban ismét elérte a korábbi szintet (10.723) (ha figyelembe vesszük Nagy-Britannia kiesését). A legionellózisban való megbetegedések száma Olaszországban 2.726, Franciaországban 2.039, Spanyolországban 1.704, Németországban 1.524 volt.

A legtöbb megbetegedés, más évekhez hasonlóan (6.521; 61%) június és október között következett be. A csúcs 1.676 bejelentett megbetegedéssel júliusban volt.

A legionellózis leggyakrabban otthoni környezetben lép fel. Az esetek egyötöde utazáshoz kapcsolódik. Ebben a tekintetben 2021-ben mind a külföldi (253-ról 457 esetre), mind belföldi utazásoknál (402-ről 658 esetre) növekedés volt megfigyelhető. Az utazásokkal összefüggő megbetegedések száma összességében 38%-kal növekedett, ami csak kevéssel marad el a pandémia előtti időszakról.

Az ambulánsan szerzett tüdőgyulladás kezelésére vonatkozó S3-irányelv szerint (2021) legionellózis esetén Levofloxacin vagy Moxifloxacin, ill. alternatívaként Azithromycin vagy Clarithromycin alkalmazandó.