

*A terhességmegszakítások statisztikája Németországban
2022-ben és 2023 második negyedében*

Statistisches Bundesamt (Destatis)

Pressemitteilung Nr. 120 vom 27. März 2023 ;

Pressemitteilung Nr. 358 vom 11. September 2023

Kulcsszavak: szülészet-nőgyógyászat, terhességmegszakítás, abortusz, Németország

Forrás Internet-helye:

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/03/PD23_120_233.html ;

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/09/PD23_358_233.html

Kapcsolódó: Contraception inequality in Europe, Social Europe, 13th February 2023:

<https://www.socialeurope.eu/contraception-inequality-in-europe-is-widening> ;

CONTRACEPTION POLICY ATLAS EUROPE (2 p.):

https://www.epfweb.org/sites/default/files/2023-02/Contraception_Policy_Atlas_Europe2023.pdf ;

GBE Pressemitteilung Nr. 120 vom 27. März 2023. (táblázatok): <https://www.gbe-bund.de/gbe/abrechnung.prc abr test logon?p uid=gasta&p aid=0&p sprache=D&p k noten=NE3315>

2022-ben Németországban 104.000 terhességmegszakítást végeztek, 9,9%-kal többet mint az azt megelőző évben. 2021-ben 94.600 esetet regisztráltak (a statisztika bevezetése óta ez volt a legalacsonyabb szint). Legutóbb 2012-ben regisztráltak több terhességmegszakítást mint 2022-ben (106.800) eset.

A terhességmegszakítások 70%-át 18-34 év közöttiek, 19%-át 35-39 év közöttiek, 8%-át 40 év fölöttiek, 3%-át 18 év alattiak körében végezték. A terhességmegszakítást megelőzően e nők 41%-a még nem szült.

A bejelentett terhességmegszakítások 96%-ára tanácsadást követően került sor. 4%-nál az indok orvosi szempont vagy szexuális erőszak volt.

51%-nál vákuumaspirációt alkalmaztak, 35%-nál a Mifegyne® (Mifepriszton) szintetikus szteroidot. A beavatkozásokat többnyire ambulánsan végezték (83% praxisokban vagy műtéti központokban; 14% kórházban ambulánsan).

2023 második negyedében 26.700 terhességmegszakítást jelentettek be, ami 4,5%-kal több mint az előző év hasonló időszakában volt.

A terhességmegszakítások 70%-át 18-34 év közöttiek, 19%-át 35-39 év közöttiek, 8%-át legalább 40 évesek, 3%-át 18 év alattiak körében végezték. A terhességmegszakítást megelőzően e nők 42% még nem szült.

A beavatkozások felét vákuumaspirációval végezték, 37%-nál a Mifegyne® (Mifepriszton) szintetikus szteroidot alkalmazták. A terhességmegszakítások többségét ambulánsan végezték (83% praxisokban vagy műtéti központokban, 14% kórházban ambulánsan).

[Lásd még: *A terhességmegszakítások statisztikája Németországban, 2015. 9. sz.; 2017. 25. sz.; 2020. 8. sz.*]