

A csípőtörések incidenciája Dániában 1996 és 2018 között

JAMA Netw Open. 2024;7(5):e249186.

doi:10.1001/jamanetworkopen.2024.9186

Kulcsszavak: balesetek, baleseti sebészet, Dánia

Forrás Internet-helye:

<https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2818119>

A csípőtörések száma Dániában 1996 és 2018 között a 80 és 104 év közöttiek körében 35-40%-kal csökkent. Az artrózissal összefüggő csípőízületi protézis műtétek rátája a 75 és 99 év közöttiek körében 60-100%-kal növekedett.

A munkaközösség a kohorszvizsgálat keretében a dán egészségügyi regiszter adatait értékelte. A felmérés az 1996. január 1. és 2018 december közötti időszakra, ill. a 40 és 104 év közötti dán lakosságra, összesen 3.664.979 személyre terjedt ki.

A kutatók összesen 42.825 törés miatti csípőprotézis műtetet számláltak. További 104.422 személy esetén a csípőprotézis beültetésére artrózis miatt került sor. A csípőtörések száma a 21. sz. első két évtizedében a 70 és 104 év közöttiek körében csökkent. A törés miatti csípőprotézis műtéten átesett lakosság aránya 50-70%-kal növekedett, miközben a 75 és 99 év közöttieknél a különbség nem jelentős.

Az artrózis miatti csípőízületi protézis műtétek rátája a 75 és 79 év közöttiek körében a legmagasabb. A ráta az ennél idősebb korosztálynál fokozatosan csökken és a kutatók szerint semmi jele annak, hogy az artrózis miatti csípőízületi protézis beültetéséhez való hozzáférés tekintetében megjelenne egy felső korhatár.

A kutatócsoport következtetése szerint a csípőtörések incidenciájának az elmúlt évtizedekben Dániában való csökkenését tükröző folyamat általános pozitív trendre utal. A csípőízületi protézisek beültetésének megfigyelt incidenciája azt mutatja, hogy az ilyen műtétek tekintetében az életkor nem számít döntő tényezőnek.