

Az antipszichotikumok demens betegeknel való alkalmazásának kockázatai

BMJ 2024; 385 (Published 17 April 2024)

Kulcsszavak: gyógyszer, antipszichotikumok, lelki egészség, demencia, Egyesült Királyság

Forrás Internet-helye: <https://www.bmj.com/content/385/bmj-2023-076268> ;
<https://www.medscape.com/viewarticle/antipsychotics-dementia-pose-wide-ranging-health-risks-2024a10007im>

Pearl Mok (Centre for Pharmacoepidemiology and Drug Safety, Division of Pharmacy and Optometry, University of Manchester, Manchester, M13 9PT, UK; Manchester Academic Health Science Centre, Manchester, UK) és mt. tanulmánya 174.000 demenciával diagnosztizált brit betegre terjedt ki. A vizsgálat keretében minden egyes beteghez, aki újonnan kapott antipszichotikumot (35.339 beteg; 62,5%-uk nő), 15 demens beteget rendeltek, aki nem részesült ilyen gyógyszerezésben. Figyelembe vették az antipszichotikumok szedésével társuló kockázatokat: akut vesekárosodás, vénás tromboembólia, stroke, törés, miokardiális infarktus, szívelégtelenség.

A kutatók a *Clinical Practice Research Datalink (CPRD)* anonimizált elektronikus egészségügyi adatait használták az elemzéshez. Az adatok a brit lakosság 20%-ának adatait képezik le és információkat tartalmaznak pl. a diagnózisokról és a felírt gyógyszerekről. A felmérésben azokat a betegeket vették figyelembe, akiknél 1998 január és 2018 május között diagnosztizálták első alkalommal a demenciát és legalább 50 évesek voltak. Az is számított, hogy egy évvel a diagnózist megelőzően nem írtak fel számukra antipszichotikumot. A vizsgálat összesen 544.203 antipszichotikum-receptre terjedt ki. A leggyakrabban felírt antipszichotikumok:

- Risperidon (29,8 %),
- Kvetiapin (28,7 %),
- Haloperidol (10,5 %),
- Olanzapin (8,8 %)

A receptek egynegyedét típusos, háromnegyedét atípusos antipszichotikumra írták fel.